

CRITERI CLINICI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO DEL PAZIENTE (Classi di Eherenwerth)

CLASSI	PAZIENTE	TRASPORTO	ASSISTENZA
I	<p>Deambulante Non richiede o richiede raramente il monitoraggio dei p.v. Può non avere bisogno di una linea venosa Non richiede la somministrazione continua di O2 Non deve essere trasferito in Terapia Intensiva</p>	<p>Non necessita di personale sanitario</p>	
II	<p>Non deambulante Non richiede o richiede raramente il monitoraggio dei p.v. Può non avere bisogno di una linea venosa Non richiede la somministrazione continua di O2 Non deve essere trasferito in Terapia Intensiva</p>	<p>Di norma infermiere del reparto di degenza del paziente</p>	<p>BLSD</p>
III	<p>Richiede frequentemente il controllo dei p.v. Ha bisogno di una linea venosa Non ha bisogno di monitoraggio invasivo Può presentare lieve compromissione dello stato di coscienza (GCS >9) Può presentare lieve o modesto distress respiratorio Richiede la somministrazione continua di O2.</p>	<p>Minimo: medico o infermiere del reparto di degenza del paziente (a giudizio del medico) Ideale: Team composto da un medico e un infermiere del reparto di degenza del paziente</p>	<p>Minimo: BLSD Ideale:ALS almeno per uno dei componenti del team</p>
IV	<p>Richiede intubazione tracheale Richiede supporto ventilatorio Ha bisogno di due linee venose o CVC Può presentare distress respiratorio grave Può essere presente una compromissione dello stato di coscienza, con GCS <9 Può richiedere la somministrazioni di farmaci salvavita</p>	<p>Team composto da un medico e un infermiere di norma del Servizio di Anestesia e Rianimazione, in situazioni in cui il fattore tempo potrebbe controindicare l'attesa di personale reperibile è accettabile l'utilizzo del Team previsto per la classe IIIe se disponibile immediatamente</p>	<p>Esperienza in area critica. ALS con capacità di gestione delle vie aeree avanzate da parte di almeno uno dei due componenti del team</p>
V	<p>Non può essere completamente stabilizzato Richiede monitoraggio e supporto vitale invasivo Richiede terapia salvavita durante il trasporto.</p>	<p>Team composto da un medico e un infermiere di norma del Servizio di Anestesia e Rianimazione, a causa della possibile non completa stabilizzazione del paziente può essere richiesta la presenza di uno specialista della branca interessata alla patologia di base del paziente (es. pediatra, ostetrico, cardiologo, chirurgo vascolare etc.)</p>	<p>Esperienza in area critica. ALS con capacità di gestione delle vie aeree avanzate da parte di almeno uno dei due componenti del team. Esperienza nella branca di competenza per lo specialista aggiuntivo</p>