



PREPARAZIONE PER COLONSCOPIA CON PLENVU (ESAME PROGRAMMATO DOPO LE ORE 10.00)

La pulizia dell'intestino è un fattore fondamentale affinché la colonscopia risulti efficace ed affidabile. Se la pulizia non è adeguata il rischio di non evidenziare polipi o altre lesioni è più elevato.

Preparazione intestinale consigliata "PLENVU" (confezione che contiene 2 dosi: **DOSE 1 una busta e DOSE 2 due buste A e B**).

Può essere acquistato in farmacia senza ricetta medica

TRE GIORNI PRIMA DELL'ESAME:

- NO FRUTTA, NO VERDURA, NO LEGUMI, NO CIBI INTEGRALI

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:

- Colazione, pranzo e cena del giorno prima dell'esame saranno costituiti **ESCLUSIVAMENTE** da liquidi chiari (brodo, thè, camomilla, miele).

- Preparare la Soluzione Plenvu versando la busta della **DOSE 1** in **½ litro di acqua**
- **Dalle ore 20.00 alle 20.30** bere la soluzione preparata
- **Successivamente bere ALMENO un altro 1/2 litro di liquidi chiari** (acqua, the, camomilla).

IL GIORNO DELL'ESAME:

- Preparare la Soluzione Plenvu versando le buste (A e B) della **DOSE 2** in **½ litro di acqua**
- **4 ore prima dell'orario fissato per l'esame (.....) bere in 30' la soluzione preparata**
- **Successivamente bere ALMENO un altro 1/2 litro di liquidi chiari** (acqua, the, camomilla)
- **E'VIETATO** assumere ogni tipo di liquido **nelle 2 ore precedenti alla procedura**

CONTROINDICAZIONI:

La preparazione non deve essere utilizzata per pazienti affetti da FENILCHETONURIA (è presente fenilalanina) e FAVISMO (è presente acido ascorbico/ascorbato).

In questi casi i pazienti devono contattare i medici della S.C.D.O. Gastroenterologia ed Endoscopica Digestiva per una preparazione alternativa.



RACCOMANDAZIONI:

I pazienti con stipsi cronica, con precedente chirurgia colo-rettale, con Parkinson, diabetici, in terapia con antidepressivi sono invitati a consultare il Medico di Famiglia (MMG) e comunque ad assumere oltre alla preparazione sopraindicata 3 compresse di LOVOLDYL 5 mg alla sera nei 3 giorni antecedenti l'inizio della preparazione.

I pazienti con pulizia inadeguata a pregresse colonscopie con le preparazioni LOVOL ESSE O MOVIPREP O PLENVU O CLENSIA sono invitati ad assumere preparazione frazionata con SELG ESSE 4L (v.allegato in Segreteria della Gastroenterologia) oltre all'assunzione di 3 compresse di LOVOLDYL 5 mg alla sera nei 3 giorni antecedenti l'inizio della preparazione

I pazienti di età inferiore a 18 anni sono invitati a contattare i medici della SCDO.

Potrai trovare ulteriori indicazioni consultando il sito
www.maggioreosp.novara.it/site/home/attivita-assistenziale/strutture-sanitarie/elenco-delle-strutture-sanitarie/scheda8000031.html